

***Pileolaria terebinthi* Cast.**

**Roya de la cornicabra**

**Sinónimos:** *Uredo terebinthi* DC, *Uromyces terebinthi* (DC) G. Winter.

**Taxonomía:** Reino Fungi, Filo Basidiomycota (División Eumycota, Subdivisión Basidiomycotina, Clase Basidiomycetes).

**Descripción:** Hay poca información sobre esta roya; se desconoce si es autoica o heteroica, aunque parece que forma uredios, uredosporas y telios productores de teliosporas provistas de largos y persistentes pedicelos hialinos.

**Huéspedes:** Cornicabra (*Pistacia terebinthus*).

**Sintomatología:** Manchas pardas, pardo rojizas o violáceas en las hojas, tanto en el haz como en el envés, rodeadas por un fino margen amarillento. Las manchas se vuelven costrosas cuando las estructuras reproductoras maduran y forman teliosporas. El hongo provoca grandes necrosis en las hojas de la cornicabra, a veces con perforaciones de los limbos, dando lugar a su caída precoz.

**Referencias:**

- Muñoz López, C., Pérez Fortea, V., Cobos Suárez, P., Hernández Alonso, R. y Sánchez Peña, G. (2003). Sanidad Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los montes. Ed. Mundi Prensa, Madrid, 576 pp.