

***Spilocaea oleagina* (Castagne) Hughes**
Repilo del olivo

Sinónimos: *Cyloconium oleaginum* Castagne.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Hyphomycetes).

Descripción: Forma conidióforos unicelulares, filidiformes, de color amarillento y muy pequeños, que llevan conidias piriformes, marrones, con un septo transversal donde la conidia se constriñe y miden 14-27 x 9-15 μm .

Huéspedes: Olivo.

Sintomatología: Provoca la aparición de manchas de color pardo oscuro, circulares y anilladas con un centro verde. Con el tiempo toman aspecto aterciopelado y aparecen con un halo amarillo claro, violeta o pardo claro. Puede infectar el pedúnculo del fruto, provocando su caída.

Referencias:

- Benlloch, M. (1942). Observaciones sobre algunas enfermedades del olivo. Boletín Patología Vegetal y Entomología Agrícola 11: 1-12.
- Benlloch, M. (1945). Clave para reconocer las plagas y enfermedades del olivo por sus síntomas externos. Publicación Estación Fitopatológica Agrícola de Madrid 16: 14pp.
- Estaciones de Patología Vegetal. (1926). Trabajos de las Estaciones de Patología Vegetal. Publicación Estación Patología Vegetal 1: 107-113.