

***Ascochyta hortorum* (Speg.) Smith**
Necrosis apical del fruto

Sinónimos: *Phoma exigua* Desm., *Ascochyta cinarae* Died.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripción: Picnidios de forma esférica, de aproximadamente 150 µm de diámetro en los que resalta muy claramente el ostiolo. Conidias generalmente bicelulares aunque a veces pueden encontrarse algunas unicelulares, cilíndricas y ligeramente asimétricas, de 10-12 x 2-4 µm de diámetro.

Huéspedes: Numerosos, pero principalmente alcachofa.

Sintomatología: Causa una necrosis de color oscuro en el extremo de las brácteas, que puede evolucionar hasta alcanzar 1/3 de la superficie de las mismas. Generalmente afecta a todas las brácteas del capítulo a la vez, observándose las puntas ennegrecidas. Esta sintomatología se puede confundir con las producidas por encharcamientos temporales o frío, aunque en éstas nunca se producen picnidios.

Referencias:

- García Figueres, F. (1996). *Ascochyta hortorum* (Speg.) Smith. Necrosis apical del fruto. Fichas de diagnóstico en laboratorio de organismos nocivos de los vegetales. Ficha 23. MAPA. Madrid.