

***Ascochyta pisi* Lib.**

Antracnosis

Sinónimos: *Sphaeria concava* Berk.; *Ascochyta pisicola* (Berk.) Sacc.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripción: Picnidios de pared fina, más claros que en otras especies de *Ascochyta*, con conidias uniseptadas (muy raramente biseptadas), hialinas, oblongo cilíndricas, rectas o ligeramente curvadas, a veces con una ligera constricción a nivel del septo, con extremos redondeados, y con dos grandes gúttulas aceitosas en los extremos opuestos. No forma nunca peritecios (no se conoce su teleomorfo), y muy raramente produce clamidosporas.

Huéspedes: Principalmente ataca al guisante, pero también afecta a los géneros *Lathyrus* y *Vicia*.

Sintomatología: Manchas en hojas y en vainas, circulares, más o menos irregulares, con un borde oscuro y centro marrón pálido. Cuando el ataque es temprano puede causar caída de plántulas en pre- o postemergencia. En vainas puede causar aborto de semillas o daños en las mismas. Nunca causa daños en cuello o raíces y raramente en tallos, pero en estos casos, las manchas son más alargadas.

Referencias:

- Collar Urquijo, J. (2002). *Ascochyta pisi* Lib. Antracnosis. Fichas de diagnóstico en laboratorio de organismos nocivos de los vegetales. Ficha 171. MAPA. Madrid.
- Punithalingam, E. and Holiday, P. (1972). *Ascochyta pisi*. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria CAB, nº 334.