

***Aspergillus niger* v. Tieghem**

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Hyphomycetes).

Descripción: Se caracteriza por las conidias negras sobre un micelio de color amarillo pálido. Las cabezas conídicas son globosas. Los conidióforos son lisos e hialinos, en ocasiones con un ligero tono marrón. Las conidias son globosas y a menudo muy rugosas en su superficie; miden 4-5 µm de diámetro.

Huéspedes: Productos almacenados (cebolla, cereales), vid.

Sintomatología: Causa la pudrición del órgano de reserva. Entra por las heridas y se manifiesta en la superficie por una masa de esporas negras.

Referencias:

- Mediavilla Molina, A., Angulo Romero, J., Rodero Franganillo, J.M., Domínguez Vilches, E., Galán Soldevilla, C., García Pantaleón, F.I. (1996). Fungal contamination of potential medical interest in Spanish grain stores. *Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology* 6: 196-201.
- Ruiz Castro, A. (1950). La lucha contra las enfermedades del viñedo en España. *Boletín Patología Vegetal y Entomología Agrícola* 18: 243-280.