

Beet virus Q (BVQ)
Virus Q de la remolacha

Taxonomía: Género: Pomovirus

Descripción: Partículas tubulares de genoma tripartido, compuestas de ARN de simple cadena.

Huéspedes: Inicialmente considerado como un serotipo del Beet soil-borne virus (BSBV), actualmente se considera como un virus independiente. Se presenta frecuentemente junto con este virus y con el causante de la rizomanía en remolacha azucarera, Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV).

Sintomatología: Su manifestación sintomatológica es difícil de determinar, por presentarse de forma conjunta con el virus de la rizomanía (Beet necrotic yellow vein virus), desconociéndose asimismo su papel en la epidemiología de esta enfermedad.

Transmisión: Transmitido por *Polymyxa betae*.

Distribución geográfica: Albacete (La Roda) en España. Bélgica (Hainaut), Bulgaria, Francia, Alemania, Hungría, Irán y Holanda.

Referencias:

- Farzadfar, Sh., Pourrahim, R., Golnaraghi, A.R., Ahoonmanesh, A. (2005). First report of beet virus Q on sugarbeet in Iran. Plant Disease 89, 1359.
- Koenig, R., Pleij, C.W., Beier, C., Commandeur, U. (1998). Genome properties of Beet virus Q, a new furo-like virus from sugarbeet, determined from unpurified virus. Journal of General Virology 79, 2027-2036.
- Rubies Autonell, C., Ratti, C., Resca, R. (2006). First report of Beet virus Q in Spain. Plant Disease Vol. 90, nº 1, 110.