

***Botrytis elliptica* (Berck.) Cooke**

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Hyphomycetes).

Descripción: Conidióforos largos, de 800-900 µm, ramificados en su extremo en dos o tres ramas, con esterigmas en los que se insertan conidias globosas o piriformes de 25-30 x 15-20 µm. Sobre los tejidos afectados se forman pequeños esclerocios de 1-1,5 mm.

Huéspedes: Plantas liliáceas, principalmente *Lilium*.

Sintomatología: Sobre tallos, hojas y capullos produce manchas foliares de dos tipos: unas son circulares o elípticas de tamaño variable (1-3 cm), de color marrón oscuro más o menos rojizo y que pueden juntarse unas con otras hasta ocupar toda la superficie; el otro tipo de manchas tiene un aspecto blanquecino, también de forma circular o elíptica pero mucho menores, generalmente de menos de 0,5 cm de diámetro, en las que se aprecia una clara depresión de los tejidos y que no suelen crecer en tamaño.

Referencias:

- Collar Urquijo, J. (1996). *Botrytis elliptica* (Berck.) Cke. Mancha foliar. Fichas de diagnóstico en laboratorio de organismos nocivos de los vegetales. Ficha 26. MAPA. Madrid.