

Citrus concave gum disease
Concavidades gomosas de los cítricos

Sinónimos: Bolsillo ciego de los cítricos (Citrus blind pocket).

Taxonomía : Supuesta etiología viral.

Citopatología: Acumulación de goma en los vasos del xilema de algunos anillos de crecimiento.

Huéspedes: Naranja, mandarina y pomelo, principalmente.

Sintomatología: Causa concavidades alargadas en el tronco, que a veces son anchas y de fondo plano (*concave gum*) y otras más estrechas y profundas (*blind pocket*). En las secciones transversales de las zonas afectadas del tronco o ramas se observa acumulación de goma en forma de anillos concéntricos. Frecuentemente, en los bordes de las concavidades se producen grietas en la corteza, por las que rezuma la goma acumulada en el xilema. En las hojas jóvenes, especialmente en la brotación de primavera, se observa al trasluz la aparición de flecos cloróticos y manchas de bordes ondulados en torno al nervio principal, que se asemejan a la forma de una hoja de roble.

Transmisión: El agente se transmite por injerto.

Distribución geográfica: Zonas templadas.

Referencias:

- Guerri, J. (2000). Concavidades gomosas. En: Enfermedades de los cítricos, Duran-Vila, N., Moreno, P.(eds.). Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, pp. 65-66.
- Roistacher, C.N. (1991). Graft-transmissible diseases of citrus. Handbook for detection and diagnosis. FAO, Rome. 286 pp.