

***Cochliobolus spicifer* Nelson [Anamorfo: *Drechslera spicifera* (Bainier) von Arx]**

Sinónimos: Del teleomorfo: *Pseudocochliobolus spicifer* (Nelson) Tsuda. Del anamorfo: *Brachycladium spiciferum* Bainier, *Curvularia spicifera* (Bainier) Boedijn, *Helminthosporium spiciferum* (Bainier) Nicot y 7 más.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Loculoascomycetes).

Descripción: Teleomorfo: Pseudotecios elipsoidales, globosos, negros. Ascas cilíndricas a aclavadas, rectas o ligeramente curvadas, bitunicadas, de 130-260 x 12-20 µm. Ascosporas filiformes, de 135-240 x 3,5-7 µm, hialinas, con 6-16 tabiques, enrolladas en forma de espiral en el interior de las ascas.

Anamorfo: Conidióforos simples o en pequeños grupos, flexuosos, fuertemente geniculados, de 300 µm o más de longitud y 4-9 µm de grosor. Conidias rectas, oblongas o cilíndricas, de 20-40 x 9-14 µm, redondeadas en los extremos, de color marrón dorado en su madurez, excepto en una pequeña zona por encima de la cicatriz oscura, lisas, con tres pseudoseptos.

Huéspedes: Trigo.

Sintomatología: Manchas foliares.

Referencias:

- Marín Sánchez, J.P. y Jiménez Díaz, R. (1983). Especies de hongos fitopatógenos de trigo en Andalucía occidental: distribución e importancia. Jornadas sobre Patología Vegetal. Resúmenes de las Comunicaciones presentadas a la IV, V y VI Reuniones Anuales del Grupo Especializado de Fitopatología Microbiana de la Sociedad Española de Microbiología: 131-132. Monografías INIA nº 48.
- Sivanesan, A. and Holliday, P. (1976). *Cochliobolus spicifer*. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria N° 702.