

***Colletotrichum trichellum* (Fr.: Fr.) M. M. Duke**

Antracnosis

Sinónimos: *Amerosporium trichellum* (Fr.: Fr.) Lind., *Colletotrichum hedericola* Laub., *C. gloeosporioides* (Penz.) Sacc. var *hederae* Pass.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripción: Acérvulos de pequeño tamaño, con setas. Conidias falciformes, no muy curvadas, con grandes gúttulas en su interior y de tamaño 14-24 x 4-6 µm. Esclerocios a veces presentes.

Huéspedes: Hiedra.

Enfermedad: Manchas circulares sobre el haz de las hojas que aparecen principalmente hacia finales de verano y otoño. Color marrón claro en el centro de la mancha y más oscuro hacia los márgenes.

Referencias:

- Arx, J. A. von (1970). A revision of the fungi classified as *Gloeosporium*. Bibliotheca Mycologica. Band 24. 2nd ed. J. Cramer. 203 pp.
- Montón, C y García, F. (1996). *Colletotrichum trichellum* (Fr.: Fr.) Duke. Antracnosis. Fichas de diagnóstico en laboratorio de organismos nocivos de los vegetales. Ficha 34. MAPA. Madrid.
- Sutton, B. C. (1980). The Coelomycetes. CMI. Kew, Surrey, England. 696 pp.