

***Drechslera sorghicola* (Lefebvre & Sherwin) Richardson & Fraser**

Sinónimos: *Helmithosporium sorghicola* Lefebvre & Sherwin.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Hyphomycetes).

Descripción: Conidióforos generalmente solitarios, a veces en pequeños grupos, rectos o flexuosos, de color marrón verdoso, de más de 700 µm de longitud y 6-9 µm de anchura. Conidias ligeramente curvadas, fusiformes, de color pálido a marrón dorado, lisas, con 3-8 pseudoseptos, de 30-110 x 12-19 µm.

Huéspedes: Arroz.

Sintomatología: Manchas foliares.

Referencias:

- Ellis, M. B. and Holliday, P. (1976). *Drechslera sorghicola*. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria N° 491.
- Marín Sánchez, J.P. y Jiménez Díaz, R. (1983). Susceptibilidad de cultivares de arroz a varios hongos fitopatógenos en las marismas del Guadalquivir. Jornadas sobre Patología Vegetal. Resúmenes de las Comunicaciones presentadas a la IV, V y VI Reuniones Anuales del Grupo Especializado de Fitopatología Microbiana de la Sociedad Española de Microbiología: 18. Monografías INIA n° 48.