

***Gibberella tricineta* El-Gohll et al. [Anamorfo: *Fusarium tricinatum* (Corda) Sacc.]**

Sinónimos: Del anamorfo: *F. citriforme* Jamal, *F. sporotrichiella* var. *tricinctum* (Corda) Bilai, *F. sporotrichioides* var. *tricinctum* (Corda) Raillo, *Selenosporium tricinatum* Corda.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Pyrenomycetes).

Descripción: Teleomorfo: Peritecios de color marrón oscuro a negro. Ascosporas fusiformes, hialinas, ligeramente curvadas.

Anamorfo: Microconidias en conidióforos laterales, ovadas o piriformes, con uno o ningún septo, de 7-16 x 4,5-7,5 µm, con 1-2 fíalidas simples o ramificadas. Macroconidias formadas en esporodoquios y tienen forma de hoz, 3-5 septos y miden 26-53 x 3-4,8 µm.

Huéspedes: Gramíneas, platanera.

Sintomatología: Ataca a *Musa* spp. junto a *Fusarium oxysporium* f.sp. *cubense*, que produce la enfermedad de Panamá. En gramíneas se ha señalado produciendo podredumbres.

Referencias:

- Blesa, A.C., Morales, D. y López, I. (1979). Contribución al estudio de la micoflora de los suelos de plataneras canarias. I. El genero *Fusarium*. Fruits 34: 585-597.