

***Leptosphaeria draconis* J. Urr.**

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Loculoascomycetes).

Descripción: Peritecios esparcidos regularmente, con desarrollo intra y subepidérmico, de forma globosa elipsoide; se abren al exterior por un ostiolo papiliforme provisto de un poro, alrededor del cual se extiende una porción hialina de la pared del peritecio, constituida por células alargadas de membranas delgadas, más o menos destruidas en la madurez. Ascas octospóricas, cilíndricas y redondeadas en el ápice. Ascosporas elípticas, de color pardo, con cinco tabiques transversos, provistas de episporio relativamente grueso.

Huéspedes: Drago (*Dracaena draco* L.)

Sintomatología: Manchas pardas, amarillentas, que avanzan desde el ápice de la hoja, hasta ocupar casi toda su superficie. Se manifiesta primero en las hojas inferiores, mientras que las del centro son atacadas posteriormente. Las manchas son de forma anular, estando limitadas por un área circular incolora, en cuyo centro se observan puntos de color marrón que coinciden con la salida al exterior del poro ostiolar. A medida que la enfermedad va avanzando, las manchas van extendiendo su tamaño y los ápices de las hojas quedan completamente secos, siendo de color marrón en su totalidad.

Referencias:

- De Armas, M., Santiago, C.T., Cabrera, R., Hodgson, F., Lorenzo, C.D., Prendes, C. y Plata, P. (1984). Detección del hongo *Leptosphaeria draconis* J. Urr. en hojas de drago (*Dracaena draco* L.). Comunicaciones del III Congreso Nacional de Fitopatología: 58. Puerto de la Cruz. Tenerife.