

***Mastigosporium rubricosum* (Dearn. & Barthol.) Nannf.**

Manchas foliares del dactilo

Sinónimos: *Fusoma rubricosum* Dearn. & Barthol., *Mastigosporium rubricosum* var. *agrostidis* Bollard.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Hyphomycetes).

Descripción: Conidias hialinas, elípticas o subcilíndricas con 3 septos y que se originan a partir de conidióforos cortos reunidos generalmente en esporodoquios.

Huéspedes: Afecta exclusivamente al dactilo; la sensibilidad a la enfermedad varía mucho dependiendo del cultivar.

Sintomatología: Lesiones foliares pequeñas y ovaladas, más o menos alargadas, de color marrón oscuro y cuyo centro clarea al aumentar de tamaño. A veces los tejidos adyacentes toman un tono más rojizo o violáceo. Cuando el número de manchas es elevado, se produce una clorosis de la hoja y posterior muerte de los tejidos. Es una enfermedad de desarrollo primaveral u otoñal.

Referencias:

- Collar Urquijo. J. (1996). *Mastigosporium rubricosum* (Dearn. y Barth.) Nannf. Manchas foliares. Fichas de diagnóstico en laboratorio de organismos nocivos de los vegetales. Ficha 48. MAPA. Madrid.