

Nueva información

***Pectobacterium parmentieri* Khayi et al. 2016**

Podredumbre blanda de la patata

Taxonomía: *Pseudomonadota*; *Gammaproteobacteria*; *Enterobacterales*; *Pectobacteriaceae*.

Descripción: Bacteria con forma bacilar. Gram-negativa, anaeróbica facultativa y móvil.

Huéspedes: Patata (*Solanum tuberosum*)*.

*Huésped identificado en España.

Sintomatología: Podredumbre blanda de tubérculos.

Transmisión: Patata de siembra, agua, lluvia, viento y técnicas culturales.

Distribución geográfica: Norteamérica, Nueva Zelanda, países de África, Asia y Europa. En España se ha identificado en Castilla y León.

Referencias:

- Khayi, S., Cigna, J., Chong. T.M., Quêtu-Laurent. A., Chan. K.G., Hélias V., Faure D. (2016). Transfer of the potato plant isolates of *Pectobacterium wasabiae* to *Pectobacterium parmentieri* sp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 66: 5379-5383.
- Suárez, M.B., Fera, F.J., Martín-Robles, M.J., del Rey, F.J., Palomo, J.L. (2017). *Pectobacterium parmentieri* causing soft rot on potato tubers in Southern Europe. Plant Disease 101: 1029.