

Pelargonium flower-break virus (PFBV)
Virus de la rotura de la flor del pelargonium

Taxonomía: Familia: Tombusviridae; Género: Carmovirus.

Descripción: Partículas isométricas de aproximadamente 30 nm de diámetro. Compuesta por una cadena simple de ARN.

Huéspedes: *Pelargonium zonale*, *P. peltatum*.

Sintomatología: Rotura del color de las flores de algunos cultivares de pelargonium, en otros, sin síntomas.

Transmisión: Transmisión vegetativa, por injerto y mecánica. Transmisión en la solución nutritiva recirculante.

Distribución geográfica: Inglaterra, Alemania, Holanda, Dinamarca.

Referencias:

- Berkelmann, B., Wohanka, W., Krczal, G. (1995). Transmission of Pelargonium flower-break virus (PFBV) by recirculating nutrient solutions with and without slow sand filtration. ISHS Acta Horticulturae 382: IV International Symposium on Soil and Substrate Infestation and Disinfestation. Leuven. Belgium.
- Brunt, A.A., Crabtree, K., Dallwitz, M.J., Gibbs, A.J., Watson, L., Zurcher, E.J. (Eds.) (1996). Pelargonium flower-break virus. Plant Viruses Online: Descriptions and Lists from the VIDE Database. <http://biology.anu.edu.au>
- Hollings, M., Stone, O.M. (1974). Pelargonium flower-break virus. C.M.I./A.A.B. Descriptions of Plant Viruses N° 130.
- Pelargonium flower-break virus. ICTVdB. The Universal Virus Database. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>