

***Pezicula alba* Guthrie [Anamorfo: *Phlyctema vagabunda* Desm.]**

Lepra, antracnosis de la aceituna

Sinónimos: Del anamorfo: *Phlyctaena vagabunda* Desm., *Gloeosporium olivae* (Petri) Foschi, *G. allantoideum* Peck, *G. allantosporum* Fautr., *G. frigidum* Sacc., *G. tineum* Sacc., *Cylindrosporium olivae* Petri, etc.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Discomycetes).

Descripción: Se suele encontrar en su fase anamórfica: Conidioma estromático, abierto, unilocular, pero compartimentado y con presencia de hifas estériles (parafisos) intercaladas entre los conidióforos, que son relativamente largos (25-30 µm x 3,5-4 µm), ampuliformes, lisos flexuosos y con collaretes visibles. Conidias mayoritariamente curvadas y de extremos redondeados, de tamaño 14-30 x 2-4 µm.

Huéspedes: Olivo.

Sintomatología: En frutos verdes y maduros aparecen lesiones de tipo antracnosis, deprimidas, circulares, de borde oscuro y centro castaño-rojizo. En principio son aisladas, pero pueden llegar a ser coalescentes. En el centro de la lesión se aprecian unas pequeñas protuberancias (estromas) que acaban por romper la epidermis, apareciendo una masa amarillo-naranja de aspecto escarchado y seco.

Referencias:

- Del Moral, J., Mazón, J.J. y Santiago, R. (1986). *Phlyctaena vagabunda* (Desm.) von Arx y *Fusarium moniliforme* Sheldon, nuevos patógenos de la aceituna en España. Bol. San. Veg. Plagas 12: 9-17.
- Montón Romans, C. (1996). *Phlyctaena vagabunda* (Desm.) von Arx. Lepra, antracnosis. Fichas de diagnóstico en laboratorio de organismos nocivos de los vegetales. Ficha 54. MAPA. Madrid.
- Sutton, B. C. (1980). The Coelomycetes. C. M. I. 696 pp.