

***Phoma exigua* var. *heteromorpha* (Sch. et Sacc.) Noordeloos et Boerema**

**Taxonomía:** Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina. Clase Coelomycetes).

**Descripción:** Picnidios esféricos de 100-200 µm de diámetro, a veces ostiolados. Picnidiosporas elipsoidales con extremos redondeados, unicelulares, de tamaño 5,5-11,0 x 1,8-4,0 µm, y con menor frecuencia bicelulares.

**Huéspedes:** Adelfa (*Nerium oleander*) en cultivos de vivero.

**Sintomatología:** Manchas foliares concéntricas, ovoides o elipsoides, defoliación en diferentes grados y necrosis de brotes.

**Referencias:**

- Alvarez, L. A., Armengol, J., Jaafar, L., Vicent, A., Arona, M., Pérez-Sierra, A., Beltrán, C. y García-Jiménez, J. (2004). Presencia de *Phoma exigua* var. *heteromorpha* afectando a viveros de adelfa. Resúmenes XII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología: 135. Lloret de Mar (Girona).
- Van der AA, H. A., Boerema, G. H. and de Gruyter, J. (2000). Contributions towards a monograph of *Phoma* (Coelomycetes) VI-1. Section Phyllostictoides: Characteristics and nomenclature of its type species *Phoma exigua*. Persoonia 17 (3): 435-456.