

***Phoma pomorum* Tm.**

Sinnimos: *Phyllosticta prunicola* (Opiz) Sacc.; *Phoma prunicola* (Opiz) Wr. & Hochapf.

Taxonoma: Reino Fungi, Hongos Mitospricos (Divisin Eumycota, Subdivisin Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripcin: Tiene los picnidios esfricos a subglobosos, frecuentemente con ms de un ostiolo y de color marrn claro a oscuro. Las conidias unicelulares o, muy ocasionalmente uniseptadas, son elpticas, subhialinas, de superficie lisa, que en la madurez adquieren color marrn olivceo y miden 4,5-10 x 2-3,5 µm. Las clamidosporas se forman en largas cadenas de color marrn oscuro con cada elemento subgloboso de 8-11 µm de dimetro.

Huspedes: Limonero, manzano, peral, *Prunus* spp.

Sintomatologa: Causa el punteado de las hojas de los rboles. Tambin se ha aislado de la podredumbre del fruto del limonero. Se trata de un parsito secundario.

Referencias:

- Tuset-Barrachina, J.J., Portilla, M.T. (1985). Contribucin al conocimiento del genero *Phoma* presente en *Prunus* sp. en el rea mediterrnea. Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Proteccin Vegetal 28: 181-120.
- Unamuno, L.M. (1935). Notas Micolgicas. XI. Algunas especies interesantes de micromycetes de Vizcaya. Boletn Sociedad Espaola de Historia Natural 35: 423-436.