

***Phomopsis amygdali* (Delcr.) Tuset & Portilla**

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripción: Forma fructificaciones picnídicas con un estroma voluminoso, inicialmente subepidérmico, que posteriormente erumpe en superficie. Los conidióforos son cilíndricos, ramificados en la base y producen conidias unicelulares, hialinas y fusiformes, que miden 14-32 x 3-5 µm.

Huéspedes: Almendro, melocotonero.

Sintomatología: Las infecciones se producen en otoño por las cicatrices foliares, extendiéndose en primavera por los brotes unas lesiones pardas. Pueden llegar a marchitarse los extremos distales de los brotes. Las pérdidas por defoliación o muerte progresiva pueden ser importantes.

Referencias:

- Tuset, J. J. (2000). Chancros en ramas causados por *Phomopsis* spp. . En “Montesinos, E. *et al.* (edit.): Enfermedades de los frutales de pepita y hueso”: 72-73. Mundi- Prensa- SEF. 147 pp.
- Tuset, J.J., Portilla, M.T. (1989). Taxonomic status of *Fusicoccum amygdali* and *Phomopsis amygdalina*. Canadian Journal of Botany 67: 1275-1280.
- Vares-Megino, F., Mateo-Sagasta, E., Mijares-Álvarez, A., Barriocanal-Arnaiz, L. (1977). Epidemiología y control de *Fusicoccum amygdali* Del., parásito del almendro. Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Protección Vegetal 7: 107-138.