

***Phomopsis asparagui* (Sacc.) Bubák**

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripción: Los picnidios son aislados, inicialmente subcutáneos y posteriormente erumpentes, de color marrón a negro. Los conidióforos hialinos, septados y cilíndricos llevan conidias de dos formas: las α , cortas, de 7-9 x 2-3 μm , hialinas, ovoides a fusiformes, producidas en conidióforos largos y cilíndricos. Las β son filamentosas, hialinas, de 16-20 x 0,5 μm , producidas en conidióforos cortos y de forma cónica.

Huéspedes: Espárrago.

Sintomatología: El primer síntoma es la decoloración del tallo, seguida de la aparición de lesiones marrones y elípticas. El centro de las lesiones se torna blanquecino, con numerosos picnidios inmersos y los márgenes de color marrón oscuro. En infecciones graves puede causar defoliación en la planta, que acaba por secarse.

Referencias:

- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1993). Distribution of *Phomopsis asparagui* (Sacc.) Bubák. CMI Map 657, 1st Edition.
- Uecker, F.A., Johnson, D.A. (1991). Morphology and taxonomy of *Phomopsis* species on *Asparagus*. Mycologia 83: 192-199.