

***Phomopsis viticola* (Sacc.) Sacc.**

Excoriosis de la vid

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripción: Los picnidios, globosos, negros, solitarios, inicialmente inmersos y posteriormente erumpentes, contienen conidias α ovoides a fusoides de 7-9 x 2,5-3 μm y, en ciertas condiciones, conidias β filiformes, ligeramente curvadas, de 18-28 x 0,5-1 μm , que no pueden germinar ni infectar.

Huéspedes: Vid.

Sintomatología: Se manifiesta en sarmientos tres o cuatro entrenudos por encima de la base. Comienza por desarrollar manchas corticales pequeñas y oscuras sobre el pámpano verde. Con el verano aparecen estrias necróticas deprimidas de color violáceo, costras aisladas negruzcas y estructuras superficiales suberificadas de color pardo pálido a oscuro. Puede llegar a anillarse el pámpano. En otoño la corteza palidece en la longitud del crecimiento del año.

Referencias:

- Smith, I.M., Dunez, J., Phillips, D.H., Lelliott, R.A., Archer, S.A. (1992). Manual de enfermedades de las plantas. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.