

***Phytophthora drechsleri* Tucker**

Sinónimos: *P. erythroseptica* var. *drechsleri* (Tucker) Sarejanni.

Taxonomía: Reino Chromista. Filo Oomycota (División Eumycota, Subdivisión Mastigomycotina, Clase Oomycetes).

Descripción: Teleomorfo: Generalmente heterotático. Anteridios anfiginos. Oogonios lisos, esféricos, de 22-53 µm de diámetro. Oosporas pleróticas de 17-50 µm de diámetro.

Anamorfo: Esporangios persistentes, terminales, no papilados, ovoides y de tamaño variable, de 36-70 x 26-40 µm, proliferantes interna o externamente.

Huéspedes: *Pinus halepensis*, *Prunus* spp.

Sintomatología: Los síntomas principales son marchitez y decaimiento de acículas, necrosis y muerte de raíces. El hongo provoca la muerte de plántulas en viveros.

Referencias:

- Erwin, D. C. and Ribeiro, O. K. (1996). *Phytophthora diseases worldwide*. APS Press. 562 pp.
- Sánchez, M.E., Andicoberry, and Trapero, A. (2002). *Phytophthora* root rot of Alepo Pine in a forest nursery in Spain. *Plant Disease* 86:563.
- Stamps, J. D. (1985). *Phytophthora drechsleri*. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria nº 840.