

***Puccinia asparagi* DC.**

Roya

Taxonomía: Reino Fungi, Filo: Basidiomycota (División Eumycota, Subdivisión Basidiomycotina, Clase Urediniomycetes).

Descripción: Es una roya autoica y macrocíclica. Los picnidios son puntiformes y de color marrón. Los ecios, que les siguen gregarios, llevan eciosporas globosas a ovales y de pared hialina que miden 15-21 x 18-27 µm. Las urediosporas son globosas a elipsoidales, de pared dorada y miden 19-30 x 18-25 µm. Las teliosporas son redondeadas en la parte superior, constreñidas en el septo y de pared color castaño; miden 30-50 x 19-26 µm.

Huéspedes: Cebolla, espárrago.

Sintomatología: Causa lesiones ovales de color verde pálido hasta que se recubren por el estado uredinial en tallos, brotes y hojas, como pústulas pequeñas de color rojo óxido. Tras ellos se forman telios negros.

Referencias:

- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1996). Distribution of *Puccinia asparagui* DC. CMI Map 216, 4th. Edition.
- González Frago, R. (1924). Flora de la Península Ibérica. Uredinaceae. T I.– Género *Puccinia*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.