

***Puccinia menthae* Pers.**

Roya de la menta

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Basidiomycota (División Eumycota, Subdivisión Basidiomycotina, Clase Urediniomycetes).

Descripción: Es una roya autoica y macrocíclica. Las eciosporas son esféricas, de pared hialina y color amarillo pálido; miden 18-28 µm de diámetro. Las urediosporas son elipsoidales de pared pálida y miden 22-26 x 18-22 µm. Las teliosporas son elipsoidales, obtusas en la parte superior, constreñidas en el septo y con la pared de color pardo claro; miden 22-30 x 17-24 µm.

Huéspedes: Menta.

Sintomatología: Los rizomas invernantes se infectan dando lugar a brotes pálidos e hinchados. En las hojas se forman ecios a través de los cuales se extiende.

Referencias:

- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1969). Distribution of *Puccinia menthae* Pers. CMI Map 211, 4th. Edition.
- Gjaerum, H.B., Sunding, P. (1986). Flora of macronesia: Checklist of rust fungi (Uredinales). Sommerfeltia 4: 42 pp.
- González Frago, R. (1924). Flora de la Península Ibérica. Uredinaceae. T I.– Género *Puccinia*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
- Unamuno, L.M. (1941). Notas micológicas XIV. Contribución al estudio de los Uredinales y Ustilaginales de la flora española. Boletín Sociedad Española de Historia Natural 38: 19-36.