

***Puccinia porri* (Sow.) Winter**

Roya del puerro

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Basidiomycota (División Eumycota, Subdivisión Basidiomycotina, Clase Urediniomycetes).

Descripción: Es una roya autoica y macrocíclica. Forma uredinios, con urediniosporas de forma elíptica de 22-32 x 20-25 µm; éstas tienen las paredes hialinas a amarillentas y de superficie equinulada. Los telios, que permanecen recubiertos por la epidermis, llevan teliosporas de color marrón claro, forma elíptica y uniseptadas, que miden 35-65 x 16-28 µm. Los ecios, escasos en la naturaleza, son de color amarillento y están reunidos en grupos; llevan eciosporas esféricas a elipsoidales de 15-25 µm de diámetro. Es una especie muy parecida a *Puccinia allii*.

Huéspedes: Puerro.

Sintomatología: Los ecios se presentan en primavera sobre las hojas, en grupos de color amarillento. Los uredinios forman pústulas naranjas a pardas sobre la superficie de la hoja. Los telios, cubiertos por la epidermis de la hoja, dan lugar a las típicas pústulas negruzcas. Se produce también un manchado clorótico de las hojas que puede llevar a su muerte.

Referencias:

- González Fragoso, R. (1924). Flora de la Península Ibérica. Uredinaceae. T I.– Género *Puccinia*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
- Losa España, D.M. (1942). Aportación al estudio de la flora micológica española. Anales del Jardín Botánico de Madrid 2: 87-142.