

***Pyrenophora avenae* Ito & Kuribayashi apud Ito [Anamorfo: *Drechslera avenae* (Eidam) Scharif.]**

Sinónimos: Del anamorfo: *Helminthosporium avenae* Eidam.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Loculoascomycetes).

Descripción: Conidióforos solitarios o en grupos de 2-4, más o menos cilíndricos, rectos o flexuosos, a menudo geniculados, de color marrón, lisos, de más de 350 µm de longitud y 8-11 µm de anchura. Conidias solitarias, ocasionalmente en cadenas, rectas, cilíndricas, de color pálido amarillento a marrón verdoso, lisas, con 1-9 pseudoseptos, de 30-170 x 11-22 µm.

Huéspedes: Avena.

Sintomatología: Manchas en hojas y marchitez de plántulas.

Referencias:

- Ellis, M. B. and Waller, J. M. (1973). *Pyrenophora avenae*. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria N° 389.
- Marín Sánchez, J.P. y Jiménez Díaz, R. (1983). Nota sobre hongos fitopatógenos que afectan a cultivos de cereales en Andalucía occidental. Jornadas sobre Patología Vegetal. Resúmenes de las Comunicaciones presentadas a la IV, V y VI Reuniones Anuales del Grupo Especializado de Fitopatología Microbiana de la Sociedad Española de Microbiología: 66-68. Monografías INIA n° 48.