

***Pythium paroecandrum* Dreschler**

Taxonomía: Reino Chromista. Filo Oomycota (División Eumycota, Subdivisión Mastigomycotina, Clase Oomycetes).

Descripción: Oogonios generalmente intercalares, subglobosos, de 14-27 µm, a menudo en cadenas. Anteridios en número de 1-2 por oogonio, monoclinos o diclinos. Oosporas appleróticas, de 13-23 µm de diámetro, de pared lisa y de 1-1,5 µm de grosor. Esporangios subglobosos o elipsoides, intercalares o terminales, de 12-33 µm de diámetro.

Huéspedes: *Cupressus arizonica* L.

Sintomatología: Provoca una mortalidad cifrada entre 70 y 90% en post-emergencia de plántulas de esta especie.

Referencias:

- Tello, M.L. y Mateo-Sagasta, E. (1983). Tres especies de *Pythium* patógenas en nascencia de *Cupressus arizonica* L. ornamental. Resúmenes de las Comunicaciones presentadas a la IV, V y VI Reuniones Anuales del Grupo Especializado de Fitopatología Microbiana de la Sociedad Española de Microbiología: 56. Monografías INIA nº 48.
- Van der Plaats-Niterink, A. J. (1981). Monograph of the genus *Pythium*. Studies in Mycology 21. CBS. 242 pp.