

***Ramularia vallisumbrosae* Cavara**

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina. Clase Hyphomycetes).

Descripción: Forma tres tipos de esporas: a) conidias sobre las hojas como masas pulverulentas blancas, 1-3 septadas de 14-44 x 4 µm; b) picnidios esféricos de 55-75 µm de diámetro que contienen esporas unicelulares de 3 x 1 µm y c) esporas 3-7 septadas, de 40-85 x 2,5-3,5 µm, que se forman en cuerpos esclerociales de 75-150 µm de diámetro.

Huéspedes: *Chrysanthemum* spp., *Geranium* spp., *Hyacinthus* spp., *Narcissus* spp., *Tulipa* spp.

Sintomatología: Causa estrías de color verde grisáceo o amarillentas en los tallos y hojas. Con el tiempo las lesiones se van oscureciendo. En condiciones de humedad se forma una masa de esporas blanca.

Referencias:

- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1971). Distribution of *Ramularia vallisumbrosae* Cav. CMI Map 228, 2nd. Edition.
- Rivero, J.M. del (1969). Enfermedades criptogámicas en flores y ornamentales. Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 18: 169-190.