

***Rhynchosporium secalis* (Oudem.) J. Davis**

Escaldado

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina. Clase Hyphomycetes).

Descripción: Se desarrolla bajo la cutícula del huésped, con un micelio hialino o gris pálido y con estromas compactos. Las conidias son sésiles, generadas por células de los estromas fértiles; son hialinas, cilíndricas a ovales, con un pico apical corto y miden 12-20 x 2-4 µm.

Huéspedes: Vallico, cebada, centeno.

Sintomatología: Ataca a hojas y vainas foliares, aunque también puede hacerlo a glumas y aristas. Forma lesiones lenticulares a menudo confluyentes. Suele comenzar como una lesión en la unión entre la hoja y la vaina causando la muerte de la primera. El área afectada es gris azulada y después gris pardo, con un borde oscuro, en cebada y no en centeno. Causa pérdidas importantes.

Referencias:

- Segarra, J., Marín, J.P., Almacellas, J. (1993). Micosis de la cebada en Cataluña durante el periodo 1988-90. Investigación Agraria, Producción y Protección Vegetales 8: 457-467.
- Smith, I.M., Dunez, J., Phillips, D.H., Lelliott, R.A., Archer, S.A. (1992). Manual de enfermedades de las plantas. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.