

***Rhytisma punctatum* (Pers.) Fr. [Anamorfo: *Melasmia punctata* (Sacc. & Roum)]**

Sinónimos: Del teleomorfo: *Sphaeria subconfluens* Schwein., *Xyloma punctatum* Pers.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota. (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Discomycetes).

Huéspedes: Distintas especies de *Acer*, especialmente *A. opalus*, *A. monspessulanum*, *A. campestre* y *A. pseudoplatanus*.

Sintomatología: Grandes áreas cloróticas sobre las hojas, sobre las cuales se producen estromas alquitranados, que son de pequeño tamaño y se distinguen de *Rhytisma acerinum* porque no confluyen y aparecen frecuentemente formando distribuciones en círculo. Son típicas las áreas de retención de clorofila que aparecen rodeando los estromas, en hojas con una avanzada clorosis y próximas a caer. Sólo cuando las lesiones necróticas son numerosas, las hojas se marchitan y caen prematuramente, ya que la evolución de los daños es lenta durante todo el periodo vegetativo, por lo que la salud del árbol no se ve comprometida.

Referencias:

- Muñoz López, C., Pérez Fortea, V., Cobos Suárez, P., Hernández Alonso, R. y Sánchez Peña, G. (2003). Sanidad Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los montes. Ed. Mundi Prensa, Madrid, 576 pp.