

Septoria apiicola* Speg.*Septoriosis, viruela**

Sinónimos: *Septoria petroselini* Desm. var. *apii* Cavares, *Septoria apii* Rostrup, *Septoria apii-graveolentis* Dorogin.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripción: Picnidios globosos, separados o agregados, e inmersos en el tejido del huésped, de 75-195 µm de diámetro. Picnidiosporas hialinas, filiformes, de 1 a 5 tabiques, con ápice ligeramente apuntado y base obtusa, de 22-56 x 2-2,5 µm.

Huéspedes: Perejil, apio, apio-nabo.

Sintomatología: Afecta a las hojas. Inicialmente aparecen puntos o manchas cloróticas que posteriormente se necrosan, produciendo lesiones de tamaño variable (1-6 mm), con márgenes definidos y color marrón claro en el centro y más oscuro en la periferia. Las manchas aparecen rodeadas por un halo clorótico y pueden confluir cuando el ataque es severo. En ellas se pueden distinguir pequeños puntos negros, que son los picnidios producidos por el hongo.

Referencias:

- García Benavides, P.; Cortés Barbero, J.; Palomo Gómez, J.L.; Laucirica Alonso, M y Berra Lertxundi, D. (1999). *Septoria apiicola* Speg. Septoriosis, viruela. Fichas de diagnóstico en laboratorio de organismos nocivos de los vegetales. Ficha 141. MAPA. Madrid.
- Sutton, B.C. y Waterston, J.M. (1966). *Septoria apiicola*. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria nº 88.