

***Sphaceloma pruni* Jenkins**

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripción: Micelio inmerso, ramificado, septado, hialino a marrón claro. Acérvulos marrones. Conidióforos formados de forma poco frecuente, con 1-2 septos, cilíndricos, sin ramificar. Células conidiógenas enteroblásticas, polifialídicas. Conidias hialinas, aseptadas, elipsoidales, lisas y sin gúttulas.

Huéspedes: Se ha aislado en ciruelo europeo (*Prunus domestica* L.), ciruelo japonés (*Prunus salicina* Lindl.) y diferentes *Prunus* utilizados como portainjertos o como plantas ornamentales.

Sintomatología: Ataca a las hojas de los frutales de hueso; a partir del mes de julio se observan las manchas típicas de la "antracnosis".

Referencias:

- Tuset, J.J. y Portilla, M.T. (1983). Hongos causantes del cribado en España. Jornadas sobre Patología Vegetal. Resúmenes de las Comunicaciones presentadas a la IV, V y VI Reuniones Anuales del Grupo Especializado de Fitopatología Microbiana de la Sociedad Española de Microbiología: 59. Monografías INIA nº 48.