

***Sphaeropsis sapinea* (Fr.) Dyko & Sutton**

Sinónimos: *Diplodia pinea* (Desm.) Kickx.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripción: Picnidios en yemas, hojas y frutos, inicialmente inmersos para luego erumpir en superficie. Las conidias son pardo-amarillentas, pudiendo volverse de color marrón oscuro. Son oblongas en la base y redondeadas en el ápice, normalmente no septadas y miden 30-45 x 10-16 µm.

Huéspedes: Pino.

Sintomatología: Causa la muerte progresiva de los pinos, principalmente en los ejemplares jóvenes en plantaciones. Ocasionalmente se presenta en viveros.

Referencias:

- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1992). Distribution of *Sphaeropsis sapinea* (Fr.) Dyko & Sutton. CMI Map 459, 2nd. Edition.
- Moret, A., Nadal, M., Garcia, F., Monton, C. (1995). Caracterización de aislados de *Sphaeropsis sapinea* (Fr.) Dyko et Sutton mediante cromatografía de gases. Boletín de Sanidad Vegetal, Plagas 21: 371-376.
- Torres Juan, J. (1964). Estudio de una micosis del pino carrasco que afecta a algunas repoblaciones de la provincia de Córdoba. Anales Instituto Forestal Investigaciones Experimentales 36: 103-108.
- Torres-Juan, J. (1971). Una enfermedad importante del *Pinus halepensis* en las Islas Baleares. Boletín del Servicio de Plagas Forestales 14: 13-15.