

***Spilocaea phillyreae* (Nicolas & Aggéry) M. B. Ellis**

Sinónimos: *Cycloconium phillyreae* Nicolas & Aggéry.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Hyphomycetes).

Huéspedes: *Phillyrea angustifolia* y *P. latifolia*.

Sintomatología: El hongo se desarrolla sobre las dos caras de las hojas, provocando la aparición de manchas, que sobre la cara adaxial son de color pardo grisáceo u oliváceo y márgenes poco marcados, mientras que en la cara abaxial son de márgenes más definidos y más verdosos. Poco a poco las zonas cloróticas y necróticas se van extendiendo, provocando la muerte y caída precoz de las hojas. Las infecciones se manifiestan de forma muy desigual entre los pies, pudiendo encontrar algunos con el follaje muy afectado en contacto con otros donde la enfermedad es menos aparente.

Referencias:

- Muñoz López, C., Pérez Fortea, V., Cobos Suárez, P., Hernández Alonso, R. y Sánchez Peña, G. (2003). Sanidad Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los montes. Ed. Mundi Prensa, Madrid, 576 pp.