

***Spilocaea pyracanthae* (Otth) v.Ar×**

Moteado

Sinónimos: *Spilocaea eryobotryae* (Cav.) Hughes; *Fusicladium pyracanthae* (Otth) Viennot-Bourgin.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Hyphomycetes).

Descripción: Los conidióforos simples y de color oliváceo llevan conidias ovales a piriformes de color oliváceo a marrón, solitarias o en cadenas de hasta tres elementos. Éstas, en principio, son unicelulares, pero con el tiempo se forma un único septo; miden 12-18 x 7-10 µm.

Huéspedes: *Cotoneaster* spp., níspero, *Pyracantha* spp.

Sintomatología: Los frutos aparecen cubiertos por manchas grisáceas a negruzcas que confluyen con el tiempo y forman un revestimiento uniforme que acaba por secarlos.

Referencias:

- Benlloch, M. (1949). Observaciones fitopatológicas del año 1948. Boletín Patología Vegetal y Entomología Agrícola 16: 203-242.
- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1969). Distribution of *Spilocaea eryobotryae* (Cav.) Hughes. CMI Map 435, 1st. Edition.