

***Stemphylium sarciniforme* (Cavara) Wiltshire**

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Hyphomycetes).

Descripción: Las colonias que forma son de tono marrón oliváceo. Los conidióforos, pálidos a marrones dorados con dilataciones vesiculares de 11-14 μm de diámetro, llevan conidias subesféricas o elipsoides, marrones doradas, de superficie lisa y con septos longitudinales y transversales; miden 30-50 x 22-33 μm .

Huéspedes: Trébol.

Sintomatología: Causa una lesión característica de mancha en diana sobre las hojas. Estas lesiones evolucionan hacia pardo-marrones y causan la marchitez de las hojas. Le favorecen las plantaciones densas y la humedad.

Referencias:

- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1966). Distribution of *Stemphylium sarciniforme* (Cav.) Wiltsh. CMI Map 139, 2nd. Edition.
- Laboratorio de Criptogamia. (1942). Informe del trabajo llevado a cabo por la Estación de Fitopatología de La Coruña durante 1940-41. Publicación Estación Fitopatología Agrícola de La Coruña 14: 35 pp.