

***Trabutia quercina* (Rudolphi ex. Fr.) Sacc. & Roum. [Anamorfo: *Baeumleria quercina* (G. Arnaud) Petr.]**

Sinónimos: *Rhitisma quercinum* F. Rudolphi ex Fr.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Pyrenomycetes).

Descripción: Teleomorfo: Ascomas de 250-400 µm de diámetro; ascas en forma de saco o de clavo, de 45-55 x 17-22 µm, con ocho ascosporas, corto pedicelo y ápice de agudo a obtuso. Ascosporas dispuestas irregularmente, de 20-25 x 5-8,5 µm, de fusiformes a elipsoidales-fusiformes, generalmente curvadas y aplanadas por un lado, de pared fina, hialinas, de pared lisa, aseptadas y sin cubierta ni apéndice gelatinoso.

Huéspedes: *Quercus canariensis* Willd.

Sintomatología: Manchas alquitranosas en el haz de las hojas, la mayoría de las veces dispuestas a lo largo de las nerviaciones, aunque en algunos casos también dispersas por toda la superficie foliar. Estas lesiones se identifican claramente por su aspecto de estroma brillante, negro y costroso (de 10 a 20 mm de diámetro). En la mayoría de las hojas se observan lesiones pequeñas y en la mayoría de los árboles afectados los daños no son demasiado severos, salvo en algunos pies situados en zonas más húmedas que se ven afectados por clorosis en hojas e intensa defoliación.

Referencias:

- Trapero, A. and Sánchez, M.E. (2003). *Quercus canariensis*, a new host of *Trabutia quercina*. Plant Disease 87: 201.