

Trichoderma aureoviride* Rifai*Podredumbre de cítricos**

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina Clase Hyphomycetes).

Descripción: Colonias de crecimiento muy rápido, amarillentas a verdes, floccosas, con conidióforos ramificados que terminan en fíalidas en número de 3 ó más. Conidias hialinas o verdes, de paredes lisas, obovoides, con la base truncada, de 3-4,8 x 2-3 µm.

Huéspedes: Cítricos (mandarinas, naranjas y limones).

Sintomatología: Síntomas de podredumbre no blanda, que no hace perder a los frutos la forma esférica. Es un patógeno típico de herida o de tejido cortical lesionado. Posee una fase saprofita en el suelo y su actividad patógena la ejerce únicamente si los frutos están maduros. Penetra por las áreas de la corteza lesionadas e inicia la colonización en pocos días, adquiriendo la corteza infectada un color marrón oscuro.

Referencias:

- Kubicek, C. P. and Harman, G. E. (edit.) (1998). *Trichoderma* and *Gliocladium* vol 1. Basic biology, taxonomy and genetics. Edit. Taylor & Francis. 278 pp.
- Tuset, J., Hinarejos, C. y Mira, J.L. (1997). Enfermedades fúngicas de la post-recolección de los agrios actualmente en progreso. *Phytoma España* 90, 69-76.