

***Trochila ilicina* (Nees) Courtec.**

Sinónimos: *Eustegia ilicis* Chevall., *Sphaeria concava* Berk., *S. ilicina* Nees, *Stegia ilicis* (Chevall.) Fr., *Trochila ilicina* (Nees) Greenhalgh & Morgan-Jones, *T. ilicis* (Fr.) P. Crouan & H. Crouan, *Xyloma concava* Grev.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Discomycetes).

Descripción: Los cuerpos de fructificación son de tipo apotecio, de color negro y lo suficientemente grandes como para poder observarse a simple vista, lo que facilita la identificación del hongo. El apotecio rompe la epidermis cuando madura a través de un disco circular de unos 0,8 mm de diámetro para permitir la dispersión de las ascosporas.

Huéspedes: *Ilex aquifolium* (acebo).

Sintomatología: Manchas pardas que aparecen inicialmente por los bordes de las hojas, y que se van extendiendo hasta invadir por completo el limbo. Las hojas aún prendidas o recién caídas adoptan finalmente una tonalidad pajiza uniforme. Sobre ellas se detectan fácilmente los cuerpos de fructificación del hongo. Es un hongo específico muy frecuente, pero con un claro comportamiento secundario. Acelera la muerte de las hojas del acebo.

Referencias:

- Muñoz López, C., Pérez Fortea, V., Cobos Suárez, P., Hernández Alonso, R. y Sánchez Peña, G. (2003). Sanidad Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los montes. Ed. Mundi Prensa, Madrid, 576 pp.