

***Uncinula clandestina* (Biv. Bern.) Schr.**

Oidio del olmo

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Pyrenomycetes).

Descripción: Teleomorfo: cleistotecios globosos, al principio amarillos y posteriormente negros cuando van alcanzando la madurez. Tienen apéndices hialinos, simples y curvados en forma de espiral en el ápice. Contienen varias ascas de elipsoidales a oblongas. Ascosporas hialinas, unicelulares y de oblongas a elípticas.

Anamorfo: micelio inicialmente evanescente, después a modo de telaraña, nunca fieltroso, que en el momento de la producción de conidias se convierte en polvoriento. Conidias hialinas, unicelulares, de forma cilíndrica o de barril y formadas en cadenas cortas

Huéspedes: Olmo.

Sintomatología: El micelio es externo y se desarrolla en el haz de las hojas. Aparecen manchas blanquecinas dispersas que van aumentando y cubriendo el limbo con un polvillo de aspecto harinoso.

Referencias:

- Santiago Merino, R. (1996). *Uncinula clandestina* (Biv. Bern.) Schr. Oidio del olmo. Fichas de diagnóstico en laboratorio de organismos nocivos de los vegetales. Ficha 147. MAPA. Madrid.