

***Venturia pyrina* Aderhold [Anamorfo: *Fusicladium pyrorum* (Lib.) Fuckel]**

Moteado, roña del peral

Sinónimos: Del teleomorfo: *Endostigma pyrina* (Aderh.) Syd., *Venturia pyrina* f. *pyri* Bref. Del anamorfo: *Helminthosporium pyrorum* Lib., *Megacladosporium pyrorum* (Lib.) Viennot-Bourgin, *Arthrinium pyrinum* Wallr., *Fusidium pyrinum* Corda, *Fusicladium virescens* Bon.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota. (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Loculoascomycetes).

Descripción: Teleomorfo: Pseudotecios inmersos y globosos. Ascosporas de 12-20 x 4-8 µm, con un único septo en posición asimétrica, de color hialino a verdoso que se convierte en oliváceo con el tiempo. Anamorfo: Conidióforos erectos, simples, de hasta 90 µm de longitud y 4-9 µm de anchura, de color marrón oscuro u oliváceo y normalmente sin septos. Conidias de 17-30 x 6-10 µm, de color pardo oliváceo, con forma de pera.

Huéspedes: Peral.

Sintomatología: Moteado en hojas, frutos, yemas y brotes. También infecta a la madera causando hinchazones que acaban por reventar. En el fruto, el moteado puede llegar a dar deformaciones y grietas. Son importantes las infecciones en los brotes.

Referencias:

- Alfaro, A. y Vicente, S. (1954). Experimentos a pequeña escala con fungicidas. Boletín Instituto de Investigaciones Agronómicas 14: 163-177.
- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1968). Distribution of *Venturia pirina* Aderh. CMI Map 367, 2nd. Edition.
- Ortega, F. y Melgarejo, P. (2000). Moteado de los frutales de hueso y de pepita (*Venturia* spp.). En “Montesinos *et al.* (edit.) Enfermedades de los frutales de pepita y de hueso: 51-53 “. SEF-Mundi-Prensa. 147 pp.
- Rodríguez-Rodríguez, J. M. y Rodríguez-Rodríguez, R. (2002). *Venturia pirina* Aderhold. Moteado o roña del peral. Fichas de diagnóstico en laboratorio de organismos nocivos de los vegetales. Ficha 208. MAPA.
- Sivanesan, A. and Waller, J. M. (1974). *Venturia pirina*. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria nº 404.