

***Albugo tragopogonis* (DC) S. F. Gray**  
**“Falsa roya” blanca de las compuestas**

**Sinónimos:** *Cystopus cubicus* de Bary, *C. tragopogonis* (DC.) J. Schröt., *Uredo tragopogonis* DC.

**Taxonomía:** Reino Chromista. Filo Oomycota. (División Eumycota, Subdivisión Mastigomycotina, Clase Oomycetes).

**Descripción:** Micelio intercelular hialino, con haustorios globosos. Esporangios hialinos a amarillo claro, cilíndricos, cortos, redondeados en el ápice y de 18-24 x 12-20 µm. Oosporas esféricas, de 44-57 µm y de color marrón oscuro.

**Huéspedes:** Escorzonera, gerbera, salsifi, girasol.

**Sintomatología:** Causa la “roya blanca” de las compuestas, que infecta principalmente las hojas y, en casos excepcionales, el tallo. Se caracteriza por la presencia de manchas (soros) de color amarillento-blanquecino. Se han descrito ataques muy graves en plantaciones.

**Referencias:**

- Cambra, M., Bernal, I. (1996). *Albugo candida* (Pers.) Kuntae. *Albugo tragopogonis* (DC) Gray. Falsa roya blanca. Fichas de diagnóstico en laboratorio de organismos nocivos de los vegetales. Ficha 17. MAPA. Madrid.
- Mukerji, K. G. (1975). *Albugo tragopogonis*. CMI Descriptions of pathogenic fungi and bacteria n° 458.
- Plate, H.P., Krober, H. (1977). Weisser Rost an Gerbera auf Teneriffa (Erreger: *Albugo tragopogonis* (DC.) S.F. Gray). Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 29: 169-170.