

***Apiognomonía veneta* (Sacc. & Speg) Hönel [Anamorfo: *Discula platani* (Peck) Sacc.]
Antracnosis del plátano**

Sinónimos: Del teleomorfo: *Diaporthe veneta* Sacc. & Speg., *Gnomonia platani* Kleb., *G. veneta* (Sacc. & Speg.) Kleb. Del anamorfo: *D. nervisequa* (Fuckel) M. Morelet, *Fusarium nervisequum* Fuckel, *F. platani* Mont., *Gloeosporium nervisequum* (Fuckel) Sacc., *G. platani* (Mont.) Oudem.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Pyrenomycetes).

Descripción: Teleomorfo: Peritecios inmersos en el huésped, con un cuello largo que llega hasta la superficie, donde se encuentra el ostiolo. Las ascas contienen ocho ascosporas hialinas, ovoides y bicelulares, que miden 12-16 x 4-6 µm.

Anamorfo: Acérvulos subcuticulares cuyos conidióforos llevan conidias hialinas, unicelulares y de 10-14 x 4-6 µm.

Huéspedes: Plátano de paseo.

Sintomatología: Produce necrosis en las yemas, que no se abren en primavera, y necrosis en las ramas, brotes y hojas.

Referencias:

- Mateo-Sagasta, E. (1975). *Discula platani* (Peck.) Sacc., una peligrosa enfermedad de nuestros plátanos ornamentales. Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Protección Vegetal 5: 41-56.