

***Cochliobolus cynodontis* R. R. Nelson [Anamorfo: *Drechslera cynodontis* (Marignoni) Subram. & B. L. Jain]**

Sinónimos: Del anamorfo: *Bipolaris cynodontis* (Marignoni) Shoemaker, *Helminthosporium cynodontis* Marignoni.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Pyrenomycetes).

Descripción: Anamorfo: Conidióforos solitarios o, con frecuencia, en grupos de 2 ó 3, flexuosos, con escasa frecuencia geniculados, de color marrón oliváceo-claro y de tamaño 82-123 x 2,8-6 µm. Conidias de color marrón-claro u oliváceo-claro, de 30,7-80 x 8,2-16,4 µm, curvadas, generalmente fusoides, presentando su mayor anchura en su mitad basal y disminuyendo ésta gradualmente, hacia los extremos, con 4-10 pseudoseptos.

Huéspedes: Arroz.

Sintomatología: Síntomas muy variados, que afectan a un gran número de órganos. En láminas foliares causa puntuaciones necróticas de color marrón y manchas necróticas redondeadas de 3-5 mm de diámetro o subelipsoidales de 3 x 2 mm, de centro marrón claro o gris y borde marrón más oscuro. En raquis causa necrosis lineales de color marrón, de 1-2 x 0,5 mm y, en granos, lesiones de color marrón con centro más claro en ocasiones, subrectangulares o irregulares y ocupando la superficie total o parcialmente.

Referencias:

- Marín-Sánchez, J.P. y Jiménez-Díaz, R.M. (1981). Enfermedades del arroz en las marismas del Guadalquivir. Boletín de Sanidad Vegetal Plagas 7: 3-56.