

***Diplocarpon earliana* (Ellis & Everh.) Wolf [Anamorfo: *Marssonina fragariae* (Lib.) Dieb.]**
Abigarrado de las hojas

Sinónimos: Del teleomorfo: *Peziza earliana* Ellis & Everh., *Mollisia earliana* (Ellis & Everh.) Sacc., *Fabraea earliana* (Ellis & Everh.) Seaver. Del anamorfo: *Leptothyrium fragariae* Libert., *Gloeosporium fragariae* (Lib.) Mont., *Marsoniella fragariae* (Lib.) Höhnelt, *Ascochyta fragariae* Sacc., *A. colorata* Peck, *Marsonia fragariae* Sacc.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Discomycetes).

Descripción: Teleomorfo: Apotecios en forma de copa. Ascosporas hialinas, bicelulares, de forma elíptica u oval, de 18-28 x 4-6 µm.

Anamorfo: Acérvulos por debajo de la cutícula que acaban por erupir. Conidias bicelulares, de 18-30 x 5-7 µm, hialinas, elípticas u ovals y con un único septo transversal.

Huéspedes: Fresa.

Sintomatología: Forma lesiones de color morado con el centro más oscuro sobre las hojas, que llegan a marchitarse. Infecta los peciolo y pedúnculos de las flores, anillándolos, llegando en ocasiones a deformar el cáliz.

Referencias:

- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1969). Distribution of *Diplocarpon earlianum* (Ell.& Everh.) Wolf. CMI Map 452, 1st. Edition.
- Sivanesan, A. and Gibson, I. A. S. (1976). *Diplocarpon earliana*. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria n° 486.