

***Drechslera biseptata* (Sacc & Roum.) Richardson & Fraser**

**Sinónimos:** *Brachysporium biseptatum* (Sacc. & Roum.) Sacc., *Drechslera biformis* (E. W. Mason & S. Hughes) Subram. & B. L. Jain, *Helminthosporium biforme* E. W. Mason & S. Hughes, *H. biseptatum* Sacc. & Roum., *Marilleotia biseptata* (Sacc. & Roum.) Shoemaker.

**Taxonomía:** Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Hyphomycetes).

**Descripción:** Conidióforos solitarios o en pares, flexuosos o geniculados, de hasta 133 µm de longitud y 6 µm de anchura, con la célula basal generalmente ensanchada a modo de bulbo basal. Conidias rectas, con forma de porra, de color marrón o marrón claro, generalmente con 1-3 pseudoseptos, de 12,3-41 x 8,2-14,3 µm.

**Huéspedes:** Arroz.

**Sintomatología:** Necrosis de color marrón en ápices y láminas foliares.

**Referencias:**

- Marín-Sánchez, J. P. y Jiménez-Díaz, R. M. (1981). Enfermedades del arroz en las marismas del Guadalquivir. Boletín de Sanidad Vegetal Plagas 7: 3-56.