

***Drepanopeziza punctiformis* Gremmen [Anamorfo: *Marssonina brunnea* (Ellis & Everh.) Magnus]**

Sinónimos: Del anamorfo: *Gloeosporium brunneum* Ellis & Everh., *Marssonnia brunnea* (Ellis & Everh.) Sacc., *M. populina* Schnabl., *Marssonina populina* (Schnabl.) Magnus, *M. tremulae* Kleb., *M. tremuloides* Kleb.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Discomycetes).

Descripción: Teleomorfo: Apotecios pardo oscuros, subepidérmicos al principio y después superficiales. Ascas en forma de maza con ocho ascosporas unicelulares, hialinas y biseriadas que miden 8-15 µm de largo.

Anamorfo: Acérvulos con conidióforos pequeños y simples que portan una conidia hialina, ovoidal, bicelular, formada en pústulas, que mide 17,5-24 x 4,5-7 µm.

Huéspedes: Chopo.

Sintomatología: Causa lesiones foliares, formando apotecios en ambas caras de la hoja. Se forman pequeñas lesiones pardo oscuras que a menudo coalescen en toda la superficie. Durante el verano, en estas lesiones se forman pústulas conídicas. Las hojas muy afectadas caen prematuramente.

Referencias:

- Muñoz-López, M.C., Rupérez, A. (1976). Presencia de *Marssonina brunnea* (E & E) Magn. (Melanconiales) en España. Boletín de Sanidad Vegetal Plagas 2: 247-255.
- Muñoz López, C., Pérez Fortea, V., Cobos Suárez, P., Hernández Alonso, R. y Sánchez Peña, G. (2003). Sanidad Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los montes. Ed. Mundi Prensa, Madrid, 576 pp.