

***Fusarium oxysporum* f. sp. *ciceris* (Padwick) Matuo & Sato**  
**Fusariosis vascular del garbanzo**

**Taxonomía:** Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Deuteromycotina, Hyphomycetes)

**Descripción:** Ver *F. oxysporum* f. sp. *basilici*.

**Huéspedes:** Garbanzo.

**Sintomatología:** Comienza mostrándose en las hojas más viejas, como aclarado de venas leve y clorosis de la lámina, síntomas que posteriormente se trasladan a las hojas jóvenes. En el tallo se forman estrías longitudinales necróticas.

**Referencias:**

- Casas, A.T., Jiménez-Díaz, R.M. (1981). Occurrence and etiology of chickpea 'wilt complex' in southern Spain. International Chickpea Newsletter 5: 10-11.
- Jiménez-Díaz, R.M. (1994). La fusariosis vascular del garbanzo causada por *Fusarium oxysporum* f. sp. *ciceris*: quince años de investigación en España. Investigación Agraria, Producción y Protección Vegetales. Fuera de serie 2: 285-294.
- Jiménez-Díaz, R.M., Trapero Casas, A., Cabrera de la Colina, J. (1989). Races of *Fusarium oxysporum* f. sp. *ciceri* infecting chickpeas in southern Spain. NATO ASI Cell Biology 28: 515-520.
- Trapero-Casas, A., Jiménez-Díaz, R.M. (1985). Fungal wilt and root diseases of chickpea in southern Spain. Phytopathology 75: 1146-1151.