

***Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* (E.F. Smith) Snyder & Hansen**
Mal de Panamá

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Deuteromycotina, Hyphomycetes).

Descripción: Ver *F. oxysporum* f. sp. *basilici*.

Huéspedes: Platanera.

Sintomatología: Los síntomas son variables, generalmente causa el marchitamiento de la planta.

Referencias:

- Álvarez, C.E., García, V., Robles, J., Díaz, A. (1981). Influence des caractéristiques du sol sur l'incidence de la maladie de Panama. *Fruits* 36: 71-81.
- Blesa, A.C., Morales, D., López, I. (1979). Contribución al estudio de la micoflora de los suelos de platanera canaria. I. El género *Fusarium*. *Fruits* 34: 585-597.
- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1966). Distribution of *Fusarium oxysporum* Schlecht. CMI Map 31, 3rd. Edition.
- Charpentier, J.M. (1976). La culture bananière aux îles Canaries. *Fruits* 31: 569-585.
- García, V. (1977). État actuel des études de nutrition et fertilité en culture bananière à Tenerife. *Fruits* 32: 15-23.
- Holmes, E. (1930). The Canary banana. Banana cultivation in the Canaries. *Tropical Agriculture* 6: 320-325.